



第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



胃腸薬

胃の痛み・胃酸過多・のみすぎに

イノセア グリーン

胃は体の中でもとくにデリケートな器官で、精神的なストレスやお酒・タバコ・コーヒーなどの刺激物によって粘膜が荒れるとともに過剰に胃酸が分泌され、痛みを覚えることがあります。

イノセアグリーンは…

- 荒れた胃の粘膜を保護・修復するスクラルファートをはじめ、過剰の胃酸を中和するメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、胃酸の分泌を抑える働きがあるロートエキスなどを配合したグリーンの特粒の胃腸薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
口のかき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

【効能】

- 胃痛、胸やけ、げっぷ(おくび)、胃酸過多
- のみすぎ(過飲)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃部不快感
- 胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胃部膨満感、胃重

【用法・用量】

下記の1回服用量を食前又は食間(空腹時)に服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量と働き】1包(1.5g)中

成分	分量	働き
スクラルファート	500mg	胃粘膜障害部に選択的に結合して荒れた胃の粘膜を保護・修復し、胃の痛みにも効果をあらわします。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	500mg	過剰の胃酸を中和し、胃壁を保護する働きがあります。
ロートエキス	10mg	胃の働きを調和する神経に作用して、過剰な胃酸の分泌を抑制し、胃の痛みにも効果をあらわします。
ソウジュツ乾燥エキス	20mg (蒼朮200mgに相当)	

添加物として、炭酸Ca、CMC-Ca、マクロゴール、白糖、銅クロロフィリンNa、ポビドン、香料、L-メントールを含有します。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤に添加物として配合されている銅クロロフィリンナトリウムにより、便が緑色になることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎早くよくなりたいためのアドバイス

- お酒、タバコ、酸味の強い食べ物、香辛料(コショウ、トウガラシなど)、コーヒー、紅茶などはなるべくひかえてください。
- 胃に負担をかけないよう、消化のよいものをおとりください。
- イライラや緊張など、精神的な面にも注意してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号