

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

かぜ薬

「小児用」ベナール®液

⚠ 《使用上の注意》



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状 | 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|-------|------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ | 精神神経系 | めまい |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 | その他 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。) |
| ぜんそく | |

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき

効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法及び用量

下記の量を1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用するものとし、また、場合によっては、1日6回まで服用することとしても差し支えないが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔をおいて服用して下さい。（計量容器を添付する）

| 年 齢 | 1 回 量 |
|-------------|---------|
| 3才以上 7才未満 | 2.5 mL |
| 1才以上 3才未満 | 1.9 mL |
| 6ヶ月以上 1才未満 | 1.5 mL |
| 3ヶ月以上 6ヶ月未満 | 1.3 mL |
| 3ヶ月未満の乳児 | 服用しないこと |

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させて下さい。

成分及び分量

1本（30 mL）中に次の成分を含んでいます。

| 成 分 | 分 量 |
|----------------|--------|
| アセトアミノフェン | 350 mg |
| dℓ-塩酸メチルエフェドリン | 20 mg |
| マレイン酸クロルフェニラミン | 4 mg |
| カフェイン | 40 mg |

添加物として白糖、D-ソルビトール、サッカリンNa、エタノール、デヒドロ酢酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地