

第②類医薬品



「小児用」  
ベナール液

ZENEL

かぜの諸症状の緩和

「小児用」ベナール液

頭痛

発熱

のどの痛み

第②類医薬品 30mL

紙



4 962721 103926

## △ 使用上の注意

※**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人は服用しないで下さい。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮痙去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、果物酔い薬、アレルギー用薬等）3. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい（眠気等があらわれることがあります）。4. 服用前後は飲酒しないで下さい。5. 長期服用しないで下さい。

## ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(7) 次の診断を受けた人。甲狀腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃十二指腸潰瘍、緑内障2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすけ、くも膜、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvens・ジョンソン症候群) 中毒性表皮剥離症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、尿色黒、全身のたるみ、食欲不進等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする息苦しくなる、空咳、発熱等がみられ、こらげると悪化する、持続したりする。
ぜんそく	息をするときにゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻出血、歯ぐきの出血、発熱、疲労や顔色が白くなる、疲労感、動悸、息切れ、足が重くむくみやすくなる、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、だるさ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。口のかわき、眠気、4.5～6回服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

副作用効力制度 電話0120-149-931

## 効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法及び用量

1回 3才以上7才未満2.5mL、1才以上3才未満1.9mL、6ヶ月以上1才未満1.5mL、3ヶ月以上6ヶ月未満1.3mL  
1日3回食後および必要場合又は就寝前に服用するものとし、また場合によっては、1日2回まで服用することとして投与を変えないが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔をおいて服用して下さい。（計量容器を添付する）\*（1）用法・用量を厳守して下さい。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。（3）2歳未満の乳幼児には、医師の診察を受けてから服用させることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。（4）3ヶ月未満の乳児には服用させないで下さい。

## 成分及びび分量(300mL中)

アセトアミノフェン(300mg)、クロルフェニラミン塩酸塩20mg、クロルフェニラミン塩酸塩4mg、カフェイン水和物40mg  
添加物白糖、D-ソルビトール、サッカリンNa、エタノール、ナトリウム酢酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコール

## 保管及び取り扱ひ上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先 電話 06-6352-2381  
受付時間 9時から17時まで(土、祝日を除く)

発 売 元 せな丸工業株式会社  
大阪市淀川区3丁目6番1号  
製造販売元 せな丸工 粉河株式会社  
和歌山県紀の川市粉河40番地