

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# かぜ実妙P

第②類医薬品

体を温める働きがある生薬（ケイヒ・ショウキョウ）の入ったかぜ薬で、小粒で服用しやすい製剤です。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3) 12歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用前後は飲酒しないでください。
6. 長期連用しないでください。

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
  - (5) 次の診断を受けた人。心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、 食欲不振	泌 尿 器	排尿困難
		そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化します。

(必ず裏面もお読みください)

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなります）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれます。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりします。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれます。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれます。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 【用法・用量】

年 齢	1 回 量	年 齢	1 回 量
15歳以上	1回12粒(1包)	12歳以上15歳未満	1回 8粒

1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】 1日量（3包）中（1包12粒）

成 分	作 用	分 量
アセトアミノフェン	解熱・鎮痛作用	900mg
ジヒドロコデインリン酸塩	中枢性鎮咳剤	15mg
dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤	7.5mg
無水カフェイン	眠気防止作用	150mg
ケイヒ末	発汗・健胃作用	300mg
ショウキョウエキス	発汗・健胃作用	38mg (原生薬換算量450mg)
カンゾウエキス	緩和作用 (作用を穏やかにします)	120mg (原生薬換算量600mg)

添加物：結晶セルロース、沈降炭酸Ca、カルメロースNa、米粉、タルク、リン酸水素Ca、酸化チタン、アラビアゴム末、カルナウバロウ

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社島伊兵衛薬品 お客様くすり相談室  
☎ 076-421-3530 月～金曜日 9:00～17:00（祝日除く）

製造販売元 株式会社島伊兵衛薬品 富山県富山市梅沢町1-7-13