

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かぜ薬 トピックGX

【製品特徴】

- つらい発熱、せき、たん等のかぜの諸症状の緩和に効果のあるかぜ薬です。
- 生薬(牛黄、地竜)、アセトアミノフェンの3つの成分が熱を下げます。
 - チペピジンクエン酸塩とdl-メチルエフェドリン塩酸塩がせきをしずめます。
 - 生薬(桔梗)とチペピジンクエン酸塩がたんを出しやすくします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

裏面も必ずお読みください

症状の名称	症状
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をすときせーぜー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	食後なるべく30分以内に服用してください。
7歳未満の小児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシート凸部を指先で強く押し、裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)

(PTPシートの取り出し図)



【成分と作用】

6カプセル(成人1日量)中に次の成分を含有しています。

成分	分量	作用
牛黄	3 mg	牛の胆嚢や胆管内にできた結石で、胆汁酸、アミノ酸を含みます。解熱、強心作用があります。
地竜乾燥エキス(原生薬換算量)	90 mg (693 mg)	地竜とはミミズを乾燥したもので、解熱作用があります。
桔梗乾燥エキス末(原生薬換算量)	120 mg (600 mg)	気道の粘膜の分泌を促し、たんを出しやすくします。漢方ではたんを伴うせきや扁桃腺炎などののどの痛みにも用いられます。
アセトアミノフェン	675 mg	熱を下げ、頭痛や関節の痛みをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5 mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せきなどのアレルギー症状をおさえます。
チペピジンクエン酸塩	60 mg	せき中枢に作用して、せきをしずめます。また、気管支の分泌物を増やしてたんを出しやすくします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支を広げて、せきをしずめ、呼吸を楽にします。
無水カフェイン	60 mg	脳の血管にはたらいて、頭痛をしずめます。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、青色1号、赤色3号、黄色5号、亜硫酸水素ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎ 0120-415-688
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 日新薬品工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1