

この説明書は本剤と共に保管し、服用の際は必ずお読み下さい

2015年4月1日付「記載要綱変更に伴う改訂」

第②類医薬品

かぜ薬

カイン

カインは解熱・鎮痛・消炎薬として効果がある「アスピリン」と、かぜの解熱、のどの痛み等に鎮痛作用を発揮する「アセトアミノフェン」及び疲労感を除き、精神機能を活発にし、利尿作用を有する「カフェイン」に緑茶末を配合したかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の状態が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛剤を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛剤、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3 服用前後は飲酒しないこと

4 長期連用しないこと



相談すること

1 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状がある人。 高熱
- (6) 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍。

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診断を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ス ティーブンス・ジョンソン症候 群)、中毒性表皮壊死融 解症、急性汎発性発疹 性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲 の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)がでる、全 身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

(裏面につづく)

(表面からのつづき)

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続する。
ぜんそく	息をすときぜーぜー、ヒューヒューとなる。息苦しい等がある。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。

- 3 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

かぜの諸症状(悪寒・発熱・頭痛・関節の痛み・のどの痛み)の緩和

用法・用量

次の用量を食後30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日の服用回数
大人(15歳以上)	1包	3回まで
小児(15歳未満)	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量・はたらき (1日量 3包 2.25g)

成 分	分 量	は たら き
日局アスピリン	850mg	炎症を抑え、頭痛、関節の痛みを抑えます。 また、発熱、悪寒の解熱作用も優れています。
日局アセトアミノフェン	390mg	
日局カフェイン水和物	50mg	痛みを抑える作用を助け、頭痛を和らげます。

添加物：日局バレिशョデンブ、緑茶末

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気のすくない涼しいところに保管すること。
- 2 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い致します。



製造販売元
株式会社 福岡薬工社
〒814-0002
福岡市早良区西新1丁目4-28

お客様相談窓口
電話 092-843-4567
受付時間 9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)