

第2類医薬品

お子さまの総合かぜ薬
カコナル[®]こどもかぜシロップ
 (販売名:カコナルこどもシロップa)

かぜの諸症状に

カコナルこどもかぜシロップはお子さまの発熱、せき、鼻みず等のかぜの諸症状に効果のあるすぐれた5つの成分を配合したのみやすいイチゴ味の総合かぜ薬です。

特 長

- ノンシュガー：砂糖を使っていません(キシリトール使用)。
- ノンカフェイン：お子さまのかぜには睡眠が一番。大切な睡眠を妨げません。
- ノンコデイン：コデインを使用していません。
- 使いやすいプラスチック容器に、お子さまの誤飲防止用の安全キャップを採用しました。



使用上の注意

カコナルこどもかぜシロップは小児用ですが、総合かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
 口のかわき

成分・分量

本品60mL(3歳以上7歳未満1日量)中

成分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	300mg	発熱、悪寒、頭痛、痛みの症状をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをひきおこすヒスタミンの作用をおさえます。
デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	16mg	せき中枢に直接働いてせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	83.3mg	せきをしずめ、たんを出しやすくします。

添加物として、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、キシリトール、バラベン、dl-リンゴ酸、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、炭酸水素Na、香料(バニリン、プロピレングリコール、エタノールを含む)を含有します。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

添付の計量カップ(目盛はmLをあらわす)に、年齢に応じて下記の1回量を取り服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
3歳以上7歳未満	10mL	1日3回食後、場合によっては就寝前に服用してください。また、止むを得ない場合は約4時間の間隔をおいて、1日6回まで服用することができます。
1歳以上3歳未満	7.5mL	
6か月以上1歳未満	6mL	
3か月以上6か月未満	5mL	
3か月未満	服用しないでください	

《用法・用量に関連する注意》

- (1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)^{*}2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4)計量カップは使用のつど、よく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用のつど、ボトルの口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかり締めてください。(5)キャップが開けにくいときは、お湯が中に入らないように注意しながらキャップの部分をお湯(50～60℃)に2～3分浸してから開けてください。(6)使用期限(外箱及びボトルのラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

安全キャップ(チャイルド・レジスタントキャップ)の使用方法

〈あけ方〉

①キャップを強く押しながら

②矢印の方向にまわしてあけます。

〈しめ方〉

普通のキャップをしめる要領でしめます。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269