

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

総合かぜ薬

第2類医薬品

# タイムコールP錠

かぜは、発熱、頭痛、関節の痛み、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛みなどのさまざまな症状を伴います。

タイムコールP錠は、かぜに伴う諸症状に効果のある総合かぜ薬です。優れた解熱鎮痛効果のあるイソプロピルアンチピリンのほか、鎮咳去痰成分や抗ヒスタミン剤を配合しています。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
  - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがある)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人     | (6) 次の症状のある人         |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人       | 高熱、排尿困難              |
| (3) 高齢者                    | (7) 次の診断を受けた人        |
| (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人       | 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、 |
| (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 | 肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 |
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |
| その他   | 排尿困難       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

| 症状の名称   | 症 状  |
|---|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                      | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる           |

| 症状の名称 | 症 状  |
|-------|--|
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる  |
| 間質性肺炎 | 空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること） |
| ぜんそく  |  |

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、口のかわき

### 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください

| 年 齢        | 1回量     |
|------------|---------|
| 成人（15才以上）  | 3錠      |
| 11才以上15才未満 | 2錠      |
| 6才以上11才未満  | 1錠      |
| 6才未満       | 服用しないこと |



### <用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

### 成分・分量

成人1日量（9錠）中に次の成分を含んでいます

| 成 分             | 含 量                   | はたらき                            |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| イソプロピルアンチピリン*   | 300mg                 | かぜに伴う熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます |
| アセトアミノフェン       | 450mg                 | せきをおさえます                        |
| ジヒドロコデインリン酸塩    | 18mg                  | せきをしずめ、たんを出しやすくします              |
| dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg                  | 鼻水、鼻づまり、くしゃみをおさえます              |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6 mg                  | たんを出しやすくします                     |
| カンゾウエキス末        | 90mg<br>(原生薬として750mg) | 頭痛、頭重をやわらげます                    |
| 無水カフェイン         | 75mg                  |                                 |

\*ピリン系成分

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、白糖、アラビアゴム、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウ、パラフィン含有しています

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

### 本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電 話：(03)3370-7174（代表）  
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）