

下線部：2012年3月改訂
2011年10月（記載要領変更に伴う改訂）

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

総合かぜ薬

第2類医薬品

タイムコールP錠

かぜは、発熱、頭痛、関節の痛み、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛みなどのさまざまな症状を伴います。

タイムコールP錠は、かぜに伴う諸症状に効果のある総合かぜ薬です。優れた解熱鎮痛効果のあるイソプロピルアンチピリンのほか、鎮咳去痰成分や抗ヒスタミン剤を配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがある)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (5)次の症状のある人
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人 高熱、排尿困難
(3)高齢者 (6)次の診断を受けた人
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたこ 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
とがある人 肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

（裏面につづく）

症状の名称	症 状
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等があらわれる、これらが急にあらわれたり、持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便祕、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください

年 齢	1回量
成人（15才以上）	3錠
11才以上15才未満	2錠
6才以上11才未満	1錠
6才未満	服用しないこと



＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分・分量

成人1日量（9錠）中に次の成分を含んでいます

成 分	含 量	はたらき
イソプロビルアントピリン*	300mg	かぜに伴う熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます
アセトアミノフェン	450mg	
ジヒドロコデインリン酸塩	18mg	せきをおさえます
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしづめ、たんを出しやすくします
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6 mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみをおさえます
カンゾウエキス末	90mg (原生葉として750mg)	たんを出しやすくします
無水カフェイン	75mg	頭痛、頭重をやわらげます

*ピリン系成分

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、白糖、アラビアゴム、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウ、パラフィンを含有しています

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になつたり品質が変わる）
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）