

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	ハイカゼ顆粒L
製品名	ハイカゼ顆粒L
製品名(読み)	ハイカゼカリキュウL
製品の特徴	ハイカゼ顆粒Lは、鎮咳成分のジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピンや解熱鎮痛成分のアセトアミノフェンのほかビタミンB1、生薬のゴオウ等を配合し、かぜの諸症状を緩和します。
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b>  <b>【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください             <ol style="list-style-type: none"> <li>本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li> </ol> </li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください              他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</li> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください              (眠気等があらわれることがあります。)</li> <li>授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</li> <li>服用前後は飲酒しないでください</li> <li>長期連用しないでください</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください             <ol style="list-style-type: none"> <li>医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>高齢者。</li> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>次の症状のある人。                      高熱、排尿困難</li> <li>次の診断を受けた人。                      甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> </ol> </li> <li>服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</li> </ol> <p>[関係部位:症状]              皮膚:発疹・発赤、かゆみ              消化器:吐き気・嘔吐、食欲不振              精神神経系:めまい              泌尿器:排尿困難              その他:過度の体温低下</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>[症状の名称:症状]              ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。              皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症:高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。              肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。              腎障害:発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。              間質性肺炎:階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。              ぜんそく:息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。              再生不良性貧血:青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりぐらっとする、血尿等があらわれる。              無顆粒球症:突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。              呼吸抑制:息切れ、息苦しさ等があらわれる。</p>

	<p>3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気</p> <p>4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>																								
効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和																								
効能関連注意																									
用法・用量	<p>次の量を、食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。</p> <p>[年齢:1回量:1日服用回数]  成人(15歳以上):1包:3回  11歳以上15歳未満:2/3包:3回  7歳以上11歳未満:1/2包:3回  3歳以上7歳未満:1/3包:3回  1歳以上3歳未満:1/4包:3回  1歳未満:服用しないでください</p>																								
用法関連注意	<p>(1)用法・用量を厳守してください。  (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  (3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。</p>																								
成分分量	<p>1日量(3包3.6g)中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900.0mg</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>7.5mg</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24.0mg</td> </tr> <tr> <td>ノスカピン</td> <td>48.0mg</td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60.0mg</td> </tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td> <td>240.0mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75.0mg</td> </tr> <tr> <td>リゾチーム塩酸塩 (リゾチームとして)</td> <td>60.0mg(力価)</td> </tr> <tr> <td>チアミンジスルフィド(ビタミンB<sub>1</sub>)</td> <td>24.0mg</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)</td> <td>12.0mg</td> </tr> <tr> <td>ゴオウ</td> <td>3.0mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900.0mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24.0mg	ノスカピン	48.0mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60.0mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240.0mg	無水カフェイン	75.0mg	リゾチーム塩酸塩 (リゾチームとして)	60.0mg(力価)	チアミンジスルフィド(ビタミンB <sub>1</sub> )	24.0mg	リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	12.0mg	ゴオウ	3.0mg
成分	分量																								
アセトアミノフェン	900.0mg																								
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																								
ジヒドロコデインリン酸塩	24.0mg																								
ノスカピン	48.0mg																								
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60.0mg																								
グアヤコールスルホン酸カリウム	240.0mg																								
無水カフェイン	75.0mg																								
リゾチーム塩酸塩 (リゾチームとして)	60.0mg(力価)																								
チアミンジスルフィド(ビタミンB <sub>1</sub> )	24.0mg																								
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	12.0mg																								
ゴオウ	3.0mg																								
添加物	メタケイ酸アルミン酸Mg、パレイシヨデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、香料																								
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  (2)小児の手のとどかない所に保管してください。  (3)他の容器に入れ替えないでください。  (誤用の原因になったり品質が変わります)  (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。</p>																								
消費者相談窓口	<p>会社名:株式会社廣貴堂  問い合わせ先:お客様相談窓口  電話番号:076-424-2259  受付時間:9時から17時まで(土・日・祝祭日を除く)</p>																								
製造販売会社	<p>(株)廣貴堂 <a href="#">添付文書情報</a>  会社名:株式会社廣貴堂  住所:富山市梅沢町2丁目9-1</p>																								
販売会社																									
剤形	散剤																								
リスク区分等	第「2」類医薬品																								