

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
 また、必要な時に読めるよう保管してください。



せき・鼻みず・熱に

# パブロンS小児液

第2類医薬品  
 (総合かぜ薬)

◆パブロンS小児液は、お子さまが服用しやすいオレンジ風味のシロップ剤で、かぜの諸症状の緩和に適した成分を配合した総合かぜ薬です。



## 使用上の注意



本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください  
 (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
 (眠気等があらわれることがあります)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



## 相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 乳児。(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告があります)  
 (4) 高齢者。  
 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (6) 次の症状のある人。  
 高熱、排尿困難  
 (7) 次の診断を受けた人。  
 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中重度表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症*	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害*	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
 便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

かぜの諸症状(せき、鼻みず、発熱、のどの痛み、くしゃみ、たん、鼻づまり、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

せき・たんに



くしゃみ・  
鼻みず・  
鼻づまりに



のどの痛み・  
発熱等に



## 成分

60mL中

フロムヘキシン塩酸塩	4mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
リゾチーム塩酸塩	20mg(力価)	鼻の炎症をしずめ、たんをやわらかくして、出しやすくします。
マレイン酸カルピノキサミン	2.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。
アセトアミノフェン	300mg	発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます。
無水カフェイン	25mg	頭痛をしずめます。

添加物：D-ソルビトール、サッカリンNa水和物、パラベン、安息香酸、クエン酸Na水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、黄色5号、香料、バニリン

## 用法・用量

添付の目盛付コップで次の量をはかり、1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。また場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。

年齢	3~6才	1~2才	3ヵ月~1才未満	3ヵ月未満
1回量	10mL	7.5mL	5mL	服用しないこと
服用回数	1日3回			


### [注意]

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- キャップを閉める前にびんの口についた液を清潔なガーゼ等でふいてください。(液が固まってキャップが開けにくくなることがあります)

## 安全キャップの使用方法

### ●開け方

- ①キャップを下に強く押しながら
- ②矢印の方向に回して開けてください。



### ●閉め方

- びんの口の周囲をよくふいてから、普通のキャップを閉める要領でしっかり閉めてください。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



## かぜをひいたお子さまの食事


### ★食欲がないときは…

水分やビタミン・ミネラルをしっかりと補給。



### ★食欲がでてきたら…

栄養価が高く、消化のよいものを。もちろん水分補給も忘れずに。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **大正製薬株式会社**  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元 **明治薬品株式会社**  
富山県富山市三郷6番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)