

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。



ブロムヘキシシン塩酸塩配合  
**パブロンS錠** 第2類医薬品  
(かぜ薬)

- ◆パブロンS錠は、たんを出しやすくするブロムヘキシシン塩酸塩を配合した総合かぜ薬です。
- ◆9つの有効成分が、かぜの不快感を効果的に改善します。
- ◆家庭の常備薬としてご使用ください。



## 使用上の注意



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります)

#### 4 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

#### 5 服用前後は飲酒しないでください

#### 6 長期連用しないでください



## 相談すること



#### 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症\*

#### 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
呼吸抑制*	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

#### 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

#### 4 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

食後なるべく30分以内に服用してください

年齢	1回量	服用回数
15才以上	3錠 	1日3回
11才~14才	2錠 	
5才~10才	1錠 	
5才未満	服用しないこと	

### [注意]

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。\*
- (4) ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

### 最初に服用する時に

- ① 瓶口シールをはがして捨ててください。



- ② 詰め物を取り出して捨ててください。  
(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると異物混入の原因になることがあります)

## 効能

かぜの諸症状(せき、たん、のどの痛み、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

のどの痛み・  
発熱等に



せき・たんに



くしゃみ・  
鼻みず・  
鼻づまりに



## 成分

3錠中

アセトアミノフェン 300mg  
発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます。

ブロムヘキシン塩酸塩 4mg  
せきの原因となるたんを出しやすくします。

ジヒドロコデインリン酸塩 8mg  
せき中枢にはたらき、せきをしずめます。

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg  
気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。

リゾチーム塩酸塩 20mg(力価)  
鼻の炎症をしずめ、たんをやわらかくして、出しやすくします。

マレイン酸カルピノキサミン 2.5mg  
くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。

無水カフェイン 25mg  
頭痛をしずめます。

ビスイプチアミン(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体) 8mg

リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) 4mg  
かぜの時に消耗しやすいビタミンを補給します。

添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、硬化油、香料、バニリン、安息香酸ベンジル、デキストリン

### [注意]

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

**連絡先** 大正製薬株式会社 お客様119番室

**電話** 03-3985-1800

**受付時間** 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)