

## ヒットミンホワイト

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	
製品名	ヒットミンホワイト
製品名(読み)	ヒットミンホワイト
製品の特徴	<p>かぜの諸症状には、発熱、悪寒、頭痛、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛みなどがあります。ヒットミンホワイトは、これらの症状に有効な各種の成分を配合した総合かぜ薬です。</p> <p>解熱作用のある地竜をはじめ、非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳剤、気管支拡張剤、抗ヒスタミン剤などを配合し、かぜの諸症状の緩和に効果をあらわします。</p> <p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●解熱作用生薬の地竜を配合</li> <li>●胃粘膜保護剤を配合</li> </ul>
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用しないでください           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(2)本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li> </ul> </li> <li>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬など)</li> <li>3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気などがあらわれることがあります。)</li> <li>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさせてください</li> <li>5. 服用前後は飲酒しないでください</li> <li>6. 長期連用しないでください</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)医師または歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>(2)妊婦または妊娠していると思われる人。</li> <li>(3)高齢者。</li> <li>(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(5)次の症状のある人。 高熱、排尿困難</li> <li>(6)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> </ul> </li> <li>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録</li> </ol>

販売者に相談してください

[関係部位:症状]

皮ふ:発疹・発赤, かゆみ  
消化器:吐き気・嘔吐, 食欲不振  
精神神経系:めまい  
泌尿器:排尿困難  
その他:過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称:症状]

ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに、皮ふのかゆみ, じんましん, 声のかすれ, くしゃみ, のどのかゆみ, 息苦しさ, 動悸, 意識の混濁などがあらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群), 中毒性表皮壊死融解症, 急性汎発性発疹性膿疱症:高熱, 目の充血, 目やに, 唇のただれ, のどの痛み, 皮ふの広範囲の発疹・発赤, 赤くなった皮ふ上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る, 全身がだるい, 食欲がないなどが持続したり, 区急激に悪化する。

肝機能障害:発熱, かゆみ, 発疹, 黄疸(皮ふや白目が黄色くなる), 褐色尿, 全身のだるさ, 食欲不振などがあらわれる。

間質性肺炎:階段を上ったり, 少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる, 空せき, 発熱などがみられ, これらが急にあらわれたり, 持続する。

ぜんそく:息をするときゼーゼー, ヒューヒューと鳴る, 息苦しいなどがあらわれる。

再生不良性貧血:青あざ, 鼻血, 歯ぐきの出血, 発熱, 皮ふや粘膜が青白くみえる, 疲労感, 動悸, 息切れ, 気分が悪くなりくらつとする, 血尿などがあらわれる。

無顆粒球症:突然の高熱, さむけ, のどの痛みなどがあらわれる。

腎障害:発熱, 発疹, 尿量の減少, 全身のむくみ, 全身のだるさ, 関節痛(節々が痛む), 下痢などがあらわれる。

呼吸抑制:息切れ, 息苦しさなどがあらわれる。

3. 服用後, 次の症状があらわれることがあるので, このような症状の持続または増強が見られた場合には, 服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師または登録販売者に相談してください

便秘, 口のかわき, 眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果	かぜの諸症状(鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和
-------	--

効能関連注意	
--------	--

用法・用量	食後なるべく30分以内に服用してください。  [年齢:1回量:1日服用回数] 成人(15才以上):2カプセル:3回 7才以上15才未満:1カプセル:3回 7才未満:服用しないでください。
-------	--

用法関連注意	(1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)カプセルの取り出し方 カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して, 裏面のアルミ箔を破り, 取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだ
--------	---

	<p>りしますと食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)          (4) 12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。</p>																								
成分分量	<p>6カプセル中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th><th>分量</th><th>内訳</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地竜乾燥エキス</td><td>129mg</td><td>(原生葉換算量993.3mg)</td></tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td><td>600mg</td><td></td></tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>7.5mg</td><td></td></tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td><td>24mg</td><td></td></tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td><td>60mg</td><td></td></tr> <tr> <td>無水カフェイン</td><td>75mg</td><td></td></tr> <tr> <td>酸化マグネシウム</td><td>140mg</td><td></td></tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	地竜乾燥エキス	129mg	(原生葉換算量993.3mg)	アセトアミノフェン	600mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg		無水カフェイン	75mg		酸化マグネシウム	140mg	
成分	分量	内訳																							
地竜乾燥エキス	129mg	(原生葉換算量993.3mg)																							
アセトアミノフェン	600mg																								
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																								
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																								
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																								
無水カフェイン	75mg																								
酸化マグネシウム	140mg																								
添加物	バレイショデンプン、炭酸カルシウム、ステアリン酸カルシウム、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na																								
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。          (2)小児の手のとどかない所に保管してください。          (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)          (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>																								
消費者相談窓口	<p>会社名:常盤薬品工業株式会社          問い合わせ先:お客様相談室          電話:0120-875-710まで          受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)</p>																								
製造販売会社	<p>常盤薬品工業(株)          会社名:常盤薬品工業株式会社          住所:大阪市中央区安土町3-5-12</p>																								
販売会社	ミネ医薬品(株) ミネ薬品																								
剤形	カプセル																								
リスク区分等	第「2」類医薬品																								