

この説明書は、服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

かぜ薬《生薬エキス配合》

第②類医薬品

# ロン三宝S錠

かぜの多くはウイルスが原因でおこりますが、治療が適切であれば、比較的なおりやすいものです。かぜの手当はできるだけ早期に心がけ、こじらせないことが大切です。本剤は解熱・鎮痛・鎮咳・抗ヒスタミン薬を配合した白い糖衣錠で、かぜの諸症状である熱・痛み・鼻水・鼻づまり・くしゃみ・せきなどの症状を効果的に改善します。さらに本剤には、生薬カンゾウエキスを配合し、のどや鼻などの炎症を緩和します。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります）

#### 4. 服用時は飲酒しないでください

#### 5. 長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人は。
- (4)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
- (5)高齢者。
- (6)本人又は家族がアレルギー体质の人。
- (7)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。  
高熱、むくみ、排尿困難
- (9)次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

## 間質性肺炎

空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあります。空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。）

## ぜんそく

(2)5~6回服用しても症状がよくならない場合。

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

□のかわき

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

1日3回、食後なるべく30分以内に次の量を水又は温湯で服用してください。

年齢	15才以上	7才~15才未満	5才~7才未満
1回量	4錠	2錠	1錠

### [用法・用量に関する注意]

(1)用法・用量を必ず守ってください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分と働き

4錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	含量	働 き
アセトアミノフェン	180mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
エテンザミド	200mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	2.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を抑えます。
クロペラスチン塩酸塩	16mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	せきをしずめ、たんをきります。
グアヤコールスルホン酸カリウム	80mg	気道粘膜の分泌機能をたかめ、たんをうすめて排出をうながします。
無水カフェイン	25mg	頭痛をしずめ、眠気を防ぎます。
カンゾウエキス	280mg	せきをしずめ、たんや痛みを抑える効果があります。

添加物として無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Ca、セラック、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、白糖、カルナウバロウを含んでいます。

### [服用時のアドバイス]

- かぜをひいたら、早くかぜ薬を服用して安静にすることが大切です。
- 部屋を暖かくし、時々窓を開けて換気をし、体を冷やさないように衣服にも注意することが必要です。汗をかいたら肌着はこまめに取り替えましょう。
- 栄養に注意し、カロリーが高く消化の良いものをとるようにするとよいでしょう。また水分を充分とり、ビタミン類も補給しましょう。
- コップ一杯のぬるま湯で服用すると効果的です。



## 保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



## お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申しあげます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100  
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造販売元

三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18