

第②類医薬品

非ピリン系総合感冒薬
小児用 **新オムニンB**

小児用新オムニンBは「かぜ」による11の諸症状を緩和する6種のすぐれた有効成分を配合した総合感冒薬です。甘くて飲みやすいシロップ剤ですから、お子様の服用に適しています。

⚠ 使用上の注意

本品は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意として成人が服用される際のことも記載しております。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります。）
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：高熱、むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス-ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい。食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢、尿量の減少等があらわれる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕

成 分	30mL中	主 な 作 用
非ピリン系 解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン 300mg	「かぜ」による悪寒、発熱、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛みをしずめます。
抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミン マレイン酸塩 2.5mg	「かぜ」のひきはじめにみられる、くしゃみ、鼻水、鼻づまりのアレルギー症状に効果をあらわします。
鎮咳剤	ジヒドロコデインリン酸塩 5mg	鎮咳作用が強く、従来から最も繁用されている咳止め薬で、咳中枢に働いて「せき」をしずめます。
気管支拡張剤	dl-メチルエフェドリン 塩酸塩 10mg	気管支を拡張し、せきをしずめてのどを楽にします。
去痰剤 (生薬)	カンゾウエキス 360mg	抗炎症作用のある去痰剤で、気道分泌を促進し、「たん」をうすめ、はき出しやすくします。
カフェイン剤	無水カフェイン 50mg	解熱鎮痛薬の鎮痛効果を増強します。

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料を含有しています。

〔効能・効果〕

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

〔用法・用量〕

次の1回量を添付の計量コップにとり、1日3回食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。場合によっては、約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用しても差し支えありません。

年 令	1 回 量
3才以上～7才未満	5.0mL
1才以上～3才未満	3.7mL
6ヵ月以上～1才未満	3.0mL
3ヵ月以上～6ヵ月未満	2.5mL

- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
(4) 計量コップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
(5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〔包 装〕

30mL(計量コップ添付)

製造販売元  **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金(祝日を除く)
9:00～17:00