

持続性かぜ薬 新エスタック®W

NEW S. TAC-W

1日2回服用のかぜ薬

- 新エスタック「W」は、効果が長く続くように工夫された持続性カプセル剤ですから、1日2回（朝・晩）の服用ですぐれた効果をあらわします。

かぜの症状に有効です

- 熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをとります。
- せきをしずめます。
- 鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります。）

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
- (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (7)次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

□のかわき

効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の1回量を1日2回、朝・夕食後に服用します。

年 齢	成人(15才以上)	7才~14才	7才未満
1回量	2カプセル	1カプセル	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出しをお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し図)

成分と作用

新エスタック「W」は、4カプセル(成人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	4カプセル中	作 用
アセトアミノフェン	480mg	熱を下げ、悪寒をとり、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをしずめます。
サリチルアミド	400mg	
クロルフェニラミン マレイン酸塩	5mg	「かぜ」によるアレルギー症状の鼻水・鼻づまりをおさえます。
ノスカピン塩酸塩水和物	20mg	せきの中樞に作用してせきを止めます。
カフェイン水和物	100mg	頭痛をしずめます。
アスコルビン酸(ビタミンC)	100mg	「かぜ」によるビタミンCの消耗を補います。

添加物として、二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、フマル酸、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、ジメチルポリシロキサン、タルク、トウモロコシデンプン、パレISHヨデンプン、ラウリル硫酸Na、エドト酸Ca/2Na、赤色3号、黄色5号、青色1号、青色2号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)アルミ袋を開封後は、品質保持の点から開封日より3か月以内に服用してください。なおPTPシート裏面のアルミ箔が破れたり、開封したまま置いておくと、湿気の影響により変色することがあります。変色したものは服用しないでください。(5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル ☎1120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>