

かぜ薬

ねつ・せき・鼻づまり

新スコGカプセル

「かぜ」という疾病は軽く考えられがちですが、その症状は大変複雑です。鼻水、鼻づまり程度から悪寒、発熱、咳を伴う場合や、頭痛や関節、筋肉の疼痛を伴う等各種の症状があります。本品は「かぜ」によるこの様な諸症状を緩和する解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン薬等種々の薬剤に加え、解熱作用のあるゴオウ、地竜の動物生薬を配合した感冒剤で、熱・せき・鼻づまりをはじめ、かぜの諸症状の緩和に優れた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
- 便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	大人(15歳以上)	7歳以上15歳未満	7歳未満
1回量	2カプセル	1カプセル	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

6カプセル（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

リン酸ジヒドロコデイン	24mg
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg
アセトアミノフェン	750mg
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg
無水カフェイン	75mg
地 竜 末	300mg
ゴ オ ウ	3mg

添加物として、パレイショデンブ、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、マクロゴール、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限（配置期限）を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 下部にPTP包装についての注意事項を記しておりますので、必ずご覧の上ご留意ください。



■お問い合わせ先 大和合同製薬株式会社 お客様相談係
 電 話 0744-27-3325 (代表)
 受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元
大和合同製薬株式会社
 奈良県橿原市川西町410

製造販売元
美吉野製薬株式会社
 奈良県吉野郡大淀町大岩692