

大人1回1カプセル服用

牛黄(和漢薬) 配合かぜ薬  
ジヒドロコデインリン酸塩新ノイセル<sup>®</sup>

第②類医薬品

「かぜ」は日常多い病気で、上気道粘膜の急性炎症やアレルギー性疾患等の、いわゆるかぜ症候群を現わす呼吸器疾患の総称です。

鼻水、くしゃみ、せき、発熱などの共通症状を伴い、こじらすといろいろの影響があらわれ、重い病気に進みがちですから早目のお手当が肝要です。

「新ノイセル」は「かぜ」の熱、せき、痛みを軽減します。



## 使用上の注意

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

## 1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 15才未満の小児

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気等があらわれることがあります)

## 4. 授乳中の方は本剤を服用しないで、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

## 5. 服用前後は飲酒しないで下さい。

## 6. 長期連用しないで下さい。

## 相談すること



## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、  
緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(裏面もお読み下さい)

皮膚粘膜眼症候群（ステイ ーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、急 性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の 発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツツ（小膿疱）が出る、全 身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身 のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々 が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労 感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見  
られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談し  
て下さい。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭  
痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15才以上）	1 カプセル	3 回
15才未満	服用しないこと	

食後なるべく30分以内に服用して下さい。

### <用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強  
く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。  
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思  
わぬ事故につながります。）



## 成分・分量 1日量（3カプセル）中

アセトアミノフェン	900mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg
クロロフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	無水カフェイン	90mg
ジヒドロコデインリン酸塩	12mg	ゴオウ（牛黄）	4mg

添加物としてパレイショデンプン、タルク、赤色3号、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、無水ケイ酸、  
ステアリン酸Mgを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室  
電 話 076(475)2121 内線 57(開発部)  
受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元

中新薬業株式会社  
富山県滑川市上小泉504-2