

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第②類医薬品

頭痛・歯痛・生理痛・発熱に

アロピラリンS[®]

®登録商標

アロピラリンSは、痛みをおさえ熱を下げる成分であるアセトアミノフェン及びエテンザミド、その効果を高める無水カフェイン、更に熱を下げる働きのあるジリュウ及び炎症を鎮めるカンゾウの生薬成分をバランスよく配合した解熱鎮痛剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある)
- 服用時は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群、 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。 |
| ぜんそく | |

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

☆頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
☆悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけ、4時間以上あけて服用してください。

| | 15才以上 | 7～15才未満 | 5～7才未満 | 5才未満 |
|-----|-------|---------|--------|---------|
| 1回量 | 2錠 | 1錠 | 1/2錠 | 服用しないこと |
| | ⊙ ⊙ | ⊙ | ∩ | × |

用法・用量に関する注意

- ① 定められた用法、用量を厳守してください。
- ② 5才未満の乳幼児には服用させないでください。
- ③ 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ④ 錠剤の取り出し方は右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してから、服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)

(PTPシートの取り出し図)



成分・分量

1回量（2錠）中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| アセトアミノフェン | 200mg | 熱を下げ、痛みをやわらげます。 |
| エテンザミド | 317mg | 熱を下げ、痛みをやわらげます。 |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | 60mg | 鎮静効果があり、痛みを止める効果を助けます。 |
| 無水カフェイン | 50mg | 熱を下げ、痛みをやわらげる効果を助けます。 |
| ジリュウエキス (原生薬換算量 154mg) | 20mg | 熱を下げる効果のある生薬です。 |
| カンゾウ乾燥エキス (原生薬換算量 233mg) | 47mg | 痛みのもとになる炎症を抑える効果のある生薬です。 |

添加物：ステアリン酸Mg、メタケイ酸アルミン酸Mg、セルロース、クロスカルメロースNa

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1錠を分割し、残りを服用する場合は、清潔な紙に包み、箱の中に保管し、2日以内に服用してください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **大昭製薬株式会社**
〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168