

がまんできない、  
つらい痛みによく効く

第2類医薬品

▼Product features



シオノギヘルスケア

ピリン系解熱鎮痛薬  
**セデス・ハイ**

セデス・ハイは、鎮痛作用の強いイソプロピルアンチピリンをはじめ4種類の成分を配合することにより、強い痛みにもすぐれた鎮痛効果をあらわします。小型の服用しやすい錠剤で速く効きしかも効果が持続します。



使用上の注意 ……



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

## 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

## 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください (眠気などがあらわれることがあります)

## 4. 服用前後は飲酒しないでください

## 5. 長期連用しないでください



相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(5) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvens-ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛 (節々が痛む)、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

(裏面につづく)



ぜんそく

息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

#### …… 効能・効果 ……

- 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

#### …… 用法・用量 ……

次の量をなるべく空腹時をさせて、水またはぬるま湯でおのみください。  
また、おのみになる間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回を限度とする
15才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。

#### ●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります)



#### …… 成分・分量 ……


セデス・ハイは、白色の二層の錠剤で、1錠中に次の成分を含有しています。

成分	含量	はたらき
イソプロピルアンチピリン(IPA)	75mg	熱を下げ、痛みをやわらげる
アセトアミノフェン	125mg	
アリルイソプロピルアセチル尿素	30mg	痛みをおさえるはたらきを助ける
無水カフェイン	25mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる

添加物として カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポピドン、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロースを含有しています。

#### …… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) PTP シートから出して他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



#### …… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「**医薬情報センター**」

電話:大阪 06-6209-6948

東京 03-3406-8450

受付時間:9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

®:登録商標

製造販売元

**シオノギヘルスケア株式会社**

大阪市中央区北浜2丁目6番18号