

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

BUFFERIN PLUS

「頭痛」などつらい痛み・「熱」に

解熱鎮痛薬

バッファリンプラス

バッファリンには有効成分の異なる製品があります。本品の解熱鎮痛成分はアセチルサリチル酸（アスピリン）、アセトアミノフェンです。医師、歯科医師、薬剤師に相談する場合は、アセチルサリチル酸（アスピリン）、アセトアミノフェンとお伝えください。

バッファリンAの鎮痛成分「アセチルサリチル酸」に3つの有効成分をプラス。

「頭痛」などのつらい痛みや「熱」に、優れた効果を発揮します。

- 鎮痛成分「アセチルサリチル酸」に、さらに、痛みによく効く「アセトアミノフェン」をプラス。
- 「無水カフェイン」と「アリルイソプロピルアセチル尿素」が、鎮痛効果を高めます。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがあります。）

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

効能

- (1) 頭痛・肩こり痛・月経痛(生理痛)・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・咽喉痛・歯痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛・耳痛の鎮痛 (2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年齢	成人(15歳以上)	15歳未満
1回量	2錠	服用しないこと
1日服用回数	2回を限度とする	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)
- (2) 用法・用量を厳守してください。



成分(1錠中)

有効成分	含量	はたらき
アセチルサリチル酸	250mg	痛みをおさえるとともに、熱を下げます。
アセトアミノフェン	150mg	
無水カフェイン	60mg	痛みをおさえる働きを助け、頭痛をやわらげます。
アリルイソプロピルアセチル尿素	15mg	

※添加物としてトウモロコシデンプン、CMC、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酸化チタン、マクロゴールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 変質の原因となりますので、包装シートをミシン目に沿って切り離す際などに、服用なさらない錠剤の裏のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。

■お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室 ☎03-3621-6100 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

■ホームページアドレス www.bufferin.net/ 製品についての詳しい情報は、ホームページでもご覧いただけます。

ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7 プラスは登録商標です。

0908