

頭痛・発熱・生理痛に

第2類医薬品

非ピリン系解熱鎮痛薬
新セデス錠

シオノギ製薬

新セデス錠は、4種類の成分を配合することにより、すぐれた鎮痛効果をあらわします。速く効き、胃にソフトな非ピリン系解熱鎮痛薬です。



使用上の注意 ……



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないで下さい

5. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児(15才未満)
- (4) 高齢者
- (5) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (6) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (7) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 | 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------|-------|-----|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ | 精神神経系 | めまい |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 | | |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、じんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱をともなって、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝機能障害 ぜんそく | 全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)などがあらわれる。 |

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合



…… 効能・効果 ……

○頭痛・歯痛・月経痛(生理痛)・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛

○悪寒・発熱時の解熱

…… 用法・用量 ……

次の量をなるべく空腹時をさけて、水またはぬるま湯でおのみ下さい。
また、おのみになる間隔は4時間以上おいて下さい。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日 服 用 回 数 |
|---------------|----------|-------------|
| 大人(15才以上) | 2錠 | 3回を限度とする |
| 小児(7才以上15才未満) | 1錠 | |
| 乳幼児(7才未満) | 服用させないこと | |

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみ下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります)



…… 成分・分量 ……

新セデス錠は、白色の錠剤で、1錠中に次の成分を含有しています。

| 成 分 | 含 量 | は た ら き |
|-----------------|--------|--------------------------|
| エテンザミド | 200 mg | 熱を下げ、痛みをやわらげる |
| アセトアミノフェン | 80 mg | |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | 30 mg | 痛みをおさえる働きを助ける |
| 無水カフェイン | 40 mg | 痛みをおさえる働きを助けるほか、頭痛をやわらげる |

添加物として 乳糖水和物、カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) PTPシートから出して他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
 塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
 電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
 (独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

…… 包 装 ……

新セデス錠：20錠、40錠、60錠

® 登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号