

乗物酔い薬
持続性製剤

この説明書は、本剤とともに保管し、
服用の際には、必ずお読みください。

J

〈ジュニア〉

アネロン「キャップ」

ANERON CAP

お子さま用の乗物酔い予防・治療薬

○楽しい旅行を台なしにする「乗物酔い」、体質的にさけることのできない場合も少なくありません。
アネロン「キャップ」は、はきけ・めまい・頭痛といった症状の予防・改善に有効なお子さま用の乗物酔い予防・治療薬です。



1日1回1カプセル

○アネロン「キャップ」は、持続性製剤ですから、乗物に乗る30分前に服用することにより、安定した効きめをあらわします。

△ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
7才未満の乳幼児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

⊗ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。 排尿困難
(7)次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

(裏面ににつづく)

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、下痢、口のかわき

■ 効能・効果

乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛の予防および緩和

■ 用法・用量

次の1回量を1日1回服用します。ただし、乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用してください。

年 齢	7才～14才	7才未満
1 回 量	1カプセル	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成 分 1カプセル中

マレイン酸フェニラミン15mg、臭化水素酸スコポラミン0.1mg、ビタミンB₆2.5mg、アミノ安息香酸エチル25mg、無水カフェイン10mg

添加物として、二酸化ケイ素、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、トウモロコシデンプン、メタクリル酸コポリマー-1、ラウリル硫酸Na、赤色3号、黄色5号、青色1号を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ 乗物酔いしやすい方へのアドバイス

1. バス・船・飛行機などに乗る前夜は、睡眠不足にならないよう気をつけましょう。
2. 消化のよい食物を適度に食べ、胃腸の調子を整えましょう。
3. 座席はなるべく揺れの少ない場所に、姿勢を楽にしてゆったりとすわりましょう。
4. 窓から遠くの景色を眺めたり、おしゃべりやゲームなどで気分をまぎらわしましょう。
5. 乗物酔いの薬は、あらかじめ服用しておく方が効果的です。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒107-8589 東京都港区赤坂4-2-6

<http://www.ssp.co.jp/>