

エステイスピール

自動車・飛行機・船・電車等の

第2類医薬品

【内服液】

20mL×5

乗物酔いだ

製造番号

使用期限

P-35C-88

自動車・飛行機・船・電車等の

乗物酔いだ

エステイスピール



乗物酔いによる
めまい・はきけ・頭痛の予防及び緩和に

第2類医薬品

【内服液】

20mL×5



乗物酔いだ

自動車・飛行機・船・電車等の

自動車・飛行機・船・電車等の

乗物酔いだ



エステスピール

第2類医薬品



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 排尿困難の症状がある人。(7) 緑内障又は心臓病の診断を受けた人。

2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき又は便秘

[成分・分量] 1日量(2本・40mL)中

臭化水素酸スコポラミン……………0.48mg
マレイン酸クロルフェニラミン……………8mg
無水カフェイン……………100mg

※添加物として白糖、クエン酸、安息香酸ナトリウム、香料、グリセリン、エタノールを含有します。

[効能・効果]

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

[用法・用量]

成人(15歳以上)1回1本(20mL)を服用してください。乗物酔いの予防には乗車船30分前に1回1本を服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1本を4時間以上の間隔をおき服用してください。1日の服用回数は2回を限度とします。

●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児には服用させないでください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

<副作用被害救済制度の問合せ先>

(独) 医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931

製造販売元

合名会社 東宝製薬

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

電話(058)251-6668



4

955103 035021