

乗物酔いによる
めまい・はきけ・頭痛の
予防及び緩和に

製造番号

使用期限

エステスピール

乗物酔いに

第2類
医薬品

自動車・飛行機・船・電車等の

乗物酔いに

エステスピール

P-35D-99



乗物酔いに



乗物酔いによる
めまい・はきけ・頭痛の予防及び緩和に

第2類医薬品

20mL×2

【成分・分量】1日量(2本・40mL)中

スコロニン臭化水素酸塩水和物…0.48mg
クロロフェニラミンソルビン酸塩…8mg
無水カフェイン……………100mg
※添加物として白糖、クエン酸水合物、安息香酸ナトリウム、香料、グリセリン、エタノールを含有します。

発売元

株式会社ピツク・ピツク

製造販売元

合名会社 東宝製薬

大阪府北区天満橋1丁目8番30号

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談窓口 ☎058-251-6668

【10:00~16:00(土日・祝日を除く)】



4 955103 035038

乗物酔いに

【効能・効果】 乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】 成人(15歳以上)1回1本(20mL)を服用してください。乗物酔いの予防には乗車前30分前に1回1本を服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合に、1回1本を4時間以上の間隔をおき服用してください。1日の服用回数は2回を限度とします。
●定められた用法・用量を厳守してください。
●小児には服用させないでください。



エステスピール

第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸痛鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)排尿困難の症状がある人。(7)緑内障又は心臓病の診断を受けた人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 □のかわき又は便秘

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。