

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

TRIVEMIN Solution

乗物酔い薬

の り も の 酔 い に

トリベミン[®]液

第2類
医薬品

- 一般に乗物酔いは、動揺病又は加速度病と呼ばれ、乗物の動揺や加速度に対して、体の平衡機能を調節している内耳の迷路器官（三半規管や前庭器官）が刺激されて興奮し、正しいバランスを保てなくなって起こるといわれています。更に、嘔吐中枢や自律神経系に興奮がひろがり、めまい・はきけ・頭痛といった症状がでてきます。
- トリベミン液は乗物酔いによるめまい・はきけ・頭痛を予防及び緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能

乗物酔いによるめまい・はきけ・頭痛の予防及び緩和

▼裏面につづく

用法・用量

乗物酔いの予防には乗車船30分前に1回1瓶(30mL)を服用してください。

年 齢	1回服用量
大人(15歳以上)	1 瓶(30mL)
15歳未満	服用しないでください

なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1瓶を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

1日の服用回数は3回を限度としてください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 内服にのみ使用してください。

成分・分量


トリベミン液は、無色～微黄色の澄明な液で、1瓶(30mL)中に次の有効成分を含んでいます。

成 分	含量(1 瓶)	作 用
塩酸メクリジン	25mg	内耳迷路の興奮を抑え、嘔吐中枢を鎮静してめまい・はきけ・頭痛をしずめます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.1mg	自律神経の興奮を抑え、めまい・はきけ・頭痛をしずめます。
無水カフェイン	25mg	頭痛をやわらげます。

添加物として、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、クエン酸、パラベン、アルコール及び香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



★乗物酔いをさけるために、次のことに注意しましょう。

1. 出発の前夜は、十分な睡眠をとりましょう。
2. 食べ過ぎ、飲み過ぎないように注意しましょう。
3. 乗物に乗る前には、トイレにいったおきましょう。
4. 乗物に乗ったら、リラックスするように心がけましょう。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 くすり情報センター
電話 0120-965-961

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

製造販売元 テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号