

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要な時に読めるよう大切に保管してください
- 使用期限（パッケージ底面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと

し かん 筋肉弛緩成分配合

コリホグス

第②類医薬品

特 徴

- ① つらい肩こりをしっかり、すばやく鎮める内服薬です
- ② 筋肉弛緩成分「クロルゾキサゾン」が、硬直した筋肉を内側からゆるめて、肩こりをほぐします
- ③ 痛み止め成分「エテンザミド」が、肩や首すじのつらい痛みを和らげます

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫など）を起こしたことがある人
 - (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 15才未満の小児及び乳幼児
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと（眠気があらわれることがある）
4. 服用時は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の診断を受けたことがある人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状があらわれることがある

その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

肩・首筋などの痛み及びこり、腰痛、背痛、ねんざ、うち身、神経痛・リウマチ性疼痛、四十肩、関節痛、筋炎、腱炎

用法・用量

大人 1回 1～2錠、1日 2回、疼痛時または発作時に水または白湯で服用してください ※ 1日 2回までとすること

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守すること

成分・分量 (2錠中)

成 分	分 量	はたらき
クロルゾキサゾン	300 mg	硬直した筋肉をゆるめて、肩のこりをほぐす
エテンザミド	300 mg	肩こりなどの体の痛みを鎮める
カフェイン水和物	50 mg	薬剤による眠気を防ぐ

添加物として、メチルセルロースを含有する

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
2. 小児の手の届かないところに保管すること
3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

●副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



おしだす

製造販売元
富山薬品株式会社

〒930-2241

富山県富山市四方西岩瀬石瀬175 番地