

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

胃の痛み・不快な胃の症状に

アバロンS錠

第2類医薬品

〈粘膜修復薬配合胃腸薬〉

◆アバロンS錠は、胃粘膜修復剤ソファルコンが胃粘膜の防御機構を強化するとともに、3種の制酸剤が出すぎた胃酸をおさえて、胃の痛み・不快感等の症状を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
- 2 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬(胃や腸の痛みをおさえる薬)
- 3 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
- 4 長期連用しないでください



相談すること



- 1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ種類の薬を服用している可能性もあります)
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(妊婦又は妊娠していると思われる婦人は薬の服用には慎重を期す必要があります)
(3) 高齢者。
[一般的に高齢者(65才以上)は、生理機能が衰えていることが多いので注意してください]
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(何らかの薬でアレルギー症状を起こした人は、本剤でも起こる可能性があります)
(6) 次の症状のある人。
排尿困難
(ロートエキスにより、前立腺肥大による排尿障害のある人はさらに尿がでにくくなる場合があります)
(7) 次の診断を受けた人。
腎臓病 (配合成分の中には腎臓から排泄されるものもあります)、
心臓病 (ロートエキスにより、脈拍があがったり、心臓がどきどきしたりする可能性があります)、
緑内障 [ロートエキスにより、緑内障の症状(例えば目の痛み、目のかすみ等)が悪化したりすることがあります]

- (8) 他の薬剤を服用している人。
(同時に服用する他の薬剤の有効性や安全性に影響を与える可能性があります)
- 2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ [☆]

(☆アレルギー症状があらわれた時は、早めの手当が重要)
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合。
(2週間の服用で症状が改善しない場合は他の病気も考えられるので、漫然と服用しないでください)
- 3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
□のかわき、便秘、下痢、胸やけ

その他の注意

- (1) 母乳が出にくくなる場合があります。
- (2) 本剤の服用により、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあるので、乗物又は機械類の運転操作には注意してください。

効 能

胃痛、胃部不快感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気)、胸やけ、飲みすぎ、胃酸過多、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、嘔吐



胃痛





胃部不快感



はきけ

用法・用量

次の量を食間又は就寝前に服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
15才以上	3錠 	1日3回
15才未満	服用しないこと 	

食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします。

- 【注意】 (1)定められた用法・用量を厳守してください。
 (2)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。
 (変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

- ①瓶口シールをはがして捨ててください。
- ②詰め物を取り出して捨ててください。
 (この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに入れると異物混入の原因になることがあります)



成 分

3錠中

成 分	分 量	はたらき
ソファルコン	100mg	アルコール、ストレス等であれた胃粘膜を修復します。
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg	あれた胃粘膜を刺激する胃酸を3種の制酸剤がおさえます。
炭酸水素ナトリウム	200mg	
ロートエキス3倍散	30mg(ロートエキスとして10mg)	

添加物：リン酸水素Ca、ショ糖脂肪酸エステル、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒプロメロース、ポリソルベート80、クロスCMC-Na、ステアリン酸Ca、香料、グリセリン、トメントール、無水ケイ酸、硬化油

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電 話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話：0120-149-931(フリーダイヤル)