

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《胃腸薬》

第3類医薬品

食べすぎ、飲みすぎ、消化不良に

ハイミロン[®]21

ハイミロン21の特長

1. ビオチンアスターゼ1000、プロザイム、リパーゼAP6の3種の消化酵素が、食物中のでんぷん、タンパク質、脂肪の消化を促進します。
2. ウルソデオキシコール酸が肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化を助けます。
3. ケイヒ末、ウイキョウ末、ゲンチアナ末、ショウキョウ末、オウレン末の5種の健胃生薬が弱った胃腸の働きを回復し、吐き気やむかつきなどの症状を緩和します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、もたれ（胃もたれ）、食べすぎ（過食）、飲みすぎ（過飲）、食欲不振（食欲減退）、胃弱、胸やけ、胸つかえ、嘔吐、消化促進、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の1回量を、1日3回、食前又は食後に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15才以上）	1 包	3 回
11才以上15才未満	2/3 包	
8才以上11才未満	1/2 包	
5才以上8才未満	1/3 包	
5才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

裏面もよくご覧ください。

成分・分量


ハイミロン21は、大人1日量3包（1包：1000mg）中に次の成分を含んでいます。

	成 分	3 包中
利 胆 剤	ウルソデオキシコール酸	60mg
消化酵素剤	ビオチンアスターゼ1000	50mg
	リパーゼAP6	45mg
	プロザイム	20mg
健 胃 生 薬	ケイヒ末	240mg
	ウイキョウ末	60mg
	ゲンチアナ末	50mg
	オウレン末	120mg
	ショウキョウ末	60mg

添加物として、*l*-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖水和物及びデキストリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。



問い合わせ先(お客様相談係)

電話番号：076-431-8863[テイカ製薬(株)]
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号