



保管及び取り扱い上の注意(1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(服用の原因になったり品質が変わる。) (4)服用期限をすぎた製品は服用しないこと。



液キヤベ

もたれ・ムカムカ・はきけ 「スツキリしたい」時

胃腸薬

●効能・効果/もたれ、はきけ(2日酔い・悪酔いのむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃部、腸部、腸管、腸炎、消化不全、腹焼け、閉つから、食欲不振、便秘、果糖酵素欠乏

●用法・用量(15歳以上)1日1回、1本を服用する。
 ●成分・含量 (50mL中) 含酸ビトリロカルカイト400mg、オキソリタミジン末30mg、人参乾燥エキス90mg(衛生菌類重量60.5mg)、アフリシジン末15mg、エキス0.3mL、左旋カイトス0.3mL、コンジュニクエキス0.3mL、香料液1.5mL、4mL、カルシウムキョウコウ粉15mg、カンクワエキス末86mg(衛生菌類重量60.2mg)〔添加剤〕白糖、安息香酸Na、パラベン、サロース、カルシウムNa、ポリビニルピロリドン、ステアリン酸、香料、エタノール
 ●性状 黄褐色の澄んだ液体、強い酸味、甘味、苦味、臭気、芳香あり
 ●内容量 瓶内液体量50mL
 ●包装 瓶内液体量50mL

医薬品 50mL

使用上の注意(1)用法はパッケージの添付文書をよく読み、必ず用法に従って服用してください。(2)服用中は、酒類、生薬、漢方薬、その他の薬品を服用しないでください。(3)服用中は、運転や機械操作など、集中力が必要な作業を控えてください。(4)服用中は、過度な運動を控えてください。(5)服用中は、十分な水分を摂取してください。(6)服用中は、日光に長時間さらさないでください。(7)服用中は、高温多湿の場所を避けてください。(8)服用中は、清潔な容器に保管してください。(9)服用中は、小児の手の届かないところに保管してください。(10)服用中は、他の薬品と併用しないようにしてください。(11)服用中は、医師の指示に従ってください。(12)服用中は、アレルギー反応を起こさないようにしてください。(13)服用中は、服用期間を必ず守ってください。(14)服用中は、服用期限を必ず守ってください。(15)服用中は、服用方法を守ってください。

●用法・用量(15歳以上)1日1回、1本を服用する。

●成分・含量 (50mL中) 含酸ビトリロカルカイト400mg、オキソリタミジン末30mg、人参乾燥エキス90mg(衛生菌類重量60.5mg)、アフリシジン末15mg、エキス0.3mL、左旋カイトス0.3mL、コンジュニクエキス0.3mL、香料液1.5mL、4mL、カルシウムキョウコウ粉15mg、カンクワエキス末86mg(衛生菌類重量60.2mg)〔添加剤〕白糖、安息香酸Na、パラベン、サロース、カルシウムNa、ポリビニルピロリドン、ステアリン酸、香料、エタノール
 ●性状 黄褐色の澄んだ液体、強い酸味、甘味、苦味、臭気、芳香あり
 ●内容量 瓶内液体量50mL
 ●包装 瓶内液体量50mL