

日本薬局方

第3類医薬品

吉見 ケイヒ末

用法及び用量

大人(15歳以上)は1回量0.3g, 1日3回, 食前又は食間に服用する

効能又は効果

胃弱, 食欲不振, 胃部・腹部膨満感, 消化不良, 胃のむかつき



4951225420929

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠しているとおもわれる人。
2. 服用に際して、定められた用法・用量を守ってください
3. 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 保管及び取り扱いの注意
 - (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。
 - (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
 - (5) 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください。
 - (6) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
 - (7) 服用に際しては、説明文をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

