丹陽印

登録 TANYO 商標

第３類医薬品

日本薬局方

吉見センブリ 10g

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
   (1) 医師の治療を受けている人
   (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ

3. １ヵ月位（食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は５～６回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、
食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法及び用量

成人(15歳以上)は１日量1.5gを､水約300mlで約半量になるまで煮つめ、かすを取り去り､食前又は食間３回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない､湿気の少ない､涼しい所に保管してください
(2) 小児の手の届かない所に保管してください
(3) 他の容器に入れ替えないでください
(4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください
(5) 煎薬の場合は､腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください
(6) 服用に際しては、説明文書をよくお読みください

吉見製薬株式会社　大阪市中央区船越町 2-1-17
電 話 06（6941）7164

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http：//www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 フリーダイヤル

4 951225 181974