

日本薬局方
第3類医薬品

吉見 センブリ末

用法及び用量


健胃の目的で用いる場合
大人(15歳以上)は1回量
0.015g, 1日3回, 食前又は食
間に服用する

止泻の目的で用いる場合
大人(15歳以上)は1回量0.3g,
1日3回を限度として服用する。
服用間隔は4時間以上おくこと

効能又は効果

胃弱, 食欲不振, 胃部・腹部
膨満感, 消化不良, 食べ過
ぎ, 飲み過ぎ, 胃のむかつき

下痢, 消化不良による下
痢, くだり腹, 軟便



4951225421971

⚠ 使用上の注意



相談すること

健胃の目的で用いる場合

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠しているとおもわれる人。
2. 服用に際して、定められた用法・用量を守ってください
3. 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

止瀉の目的で用いる場合

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人。血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります)
 - (4) 高齢者。
2. 5～6日間服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取り扱いの注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- (5) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようにご注意ください。
- (6) 服用に際しては、説明文をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

