

和漢生薬配合


イソロ<sup>®</sup>ガウンエース

第3類医薬品

ZENEL

和漢生薬配合

むかつき・もたれ・胸やけ



ウルソデオキシコール酸配合

第3類医薬品

イソロ<sup>®</sup>ガウンエース [1.3g×16]

和漢生薬 配合

イソロ<sup>®</sup> ガウンエース

第3類医薬品

副作用救済制度 電話0120-149-931

## 効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

**成分及び分量** 3包中（1包1.3g）

ウコン末1000mg、ガジュツ末1000mg、ウルソデオキシコール酸30mg、カンゾウ末300mg

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、グリセリン

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法及び用量

成人(15歳以上) 1回 1包・11歳以上15歳未満 1回 2/3包・8歳以上11歳未満 1回 1/2包を1日3回食前または食間に服用して下さい。

\* (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3) 8歳未満の小児には服用させないで下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発売元 **ゼネル** 薬品工業株式会社  
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社  
和歌山県紀の川市粉河840番地

使用期限