

服用の前にこの説明書を必ずお読みください。  
必要なときに読めるよう保管してください。

# オクダ胃腸薬〈錠剤・細粒〉

オクダ胃腸薬は、奥田の処方に基づき、その有効成分は和漢生薬を主剤として製薬した薬で、胃のもたれ、胃の痛み、胸やけなどの不快な症状にすぐれた効きめをあらわします。



## 使用上の注意

### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 腎臓病の診断を受けた人。

#### 2. 次の場合は、服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること 2週間位服用しても症状がよくなる場合。

## 効能・効果

もたれ(胃もたれ)、胃痛、胃弱、胸やけ、胃酸過多、胃重、げっぷ(おくび)、食欲不振(食欲減退)、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、胃部不快感

## 成分・分量 成人(15才以上)の1日服用量中

成分	分量	はたらき
リュウタン末	100mg	胃の炎症をおさえ、食欲を増進させます
オウレン末	10mg	便通を整え、消化不良、悪心、嘔吐、腹痛、膨満感を改善します
センブリ末	10mg	胃の痛みを和らげ、消化を助け食欲を増進させます
ダイオウ末	100mg	胃の炎症をおさえ、便通を整えて腹部膨満感を改善します
オウバク末	100mg	胃の動きをよくし、炎症をしずめ、便通を整えます
ニガキ末	400mg	胃の動きをよくし、消化を助け食欲を増進させます
コロソバ末	100mg	胃の動きをよくし、消化を助け食欲を増進させます
ニンジン末	30mg	胃の機能を高め丈夫にします
トウヒ末	50mg	食欲を増進させ、消化を助け嘔吐をしずめます
チンピ末	50mg	食欲を増進させ、消化を助け嘔吐をしずめます
エンメイソウ末	250mg	消化不良、胃腸の膨満感を治し食欲を増進させます
ボレイ末	2.5g	胃酸を中和して胃酸過多や胸やけを改善します
沈降炭酸カルシウム	2.3g	胃酸を中和して胃酸過多や胸やけを改善します

添加物として・オクダ胃腸薬(錠剤):ステアリン酸カルシウム、結晶セルロースを含有します。  
・オクダ胃腸薬(細粒):ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

\*本剤は和漢生薬を主剤としていますので、原料の採取時期などにより薬の色が多少異なることがあります。効能に変わりはありません。

## 用法・用量

次の量を、食後にさゆ又は水で服用してください。

【錠剤】	年令	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)		5錠	3回
11才以上15才未満		3錠	
8才以上11才未満		2錠	
5才以上8才未満		1錠	
5才未満		服用しないこと	

【細粒】	年令	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)		1包	3回
8才以上15才未満		1/2包	
8才未満		服用しないこと	

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を守って服用してください。

## 養生法


胃腸の病気や不快な症状は、暴飲・暴食や神経のストレスなどから起こるものです。飲み過ぎや食べ過ぎに注意し、消化のよいものを選んでよく噛みこなし、胸につかえないよう控えにすることが大切です。また、食事の時間を定め、間食をつつしみ、精神を安静にして適度の運動をすることなどが胃腸病の予防と治療につながります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 【錠剤】ビン入り品は、服用のつどビンのふたをよくしめてください。
- (5) 【細粒】1包を分割した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) ビンの中の詰め物は、錠剤の破損を防止するために入れてありますので開栓後は捨ててください。
- (7) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口 ☎ (06) 6351-2100 (代表)  
(午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

 **KUDA 奥田製薬株式会社**  
大阪市北区天満1丁目4-5

## 〈細粒〉ののみかた

- 1  さゆ又は水を少し口にふくみ
- 2  おくすりを口に入れ
- 3  流し込むようにお飲みください

