

# ガストール錠

胃腸薬 M<sub>1</sub>ブロッカー配合

- 胃酸は食物の消化に必要なものですが、ストレスや飲み過ぎなどにより必要以上に分泌されると、胃粘膜を攻撃し、胃痛・胸やけ・むかつき・胃もたれなどのつらい胃の症状を引き起こします。
- ガストール錠は、M<sub>1</sub>ブロッカーと制酸剤を配合。制酸剤が出過ぎてしまった胃酸を中和、そして、M<sub>1</sub>ブロッカーが過剰な胃酸分泌を抑制することで、つらい胃の症状に優れた効果を発揮します。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- ① 次の人は服用しないでください  
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(2) 透析療法を受けている人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



## 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 授乳中の人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。 排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
その他	排尿困難、動悸、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しき、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合。
- ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、下痢、口のかわき

## 効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ
- 食べすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振

## 用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用します。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	3錠	✕服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

○用法・用量を厳守してください。


## 成分と作用 9錠(1日量)中

成分	9錠中	作用
ピレンゼピン塩酸塩水和物 <M <sub>1</sub> ブロッカー>	47.1mg (ピレンゼピン塩酸塩 無水物として45mg)	出過ぎる胃酸の分泌を抑えます。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	900mg	胃酸を中和するとともに胃粘膜を保護します。
炭酸水素ナトリウム	1,200mg	胃酸をすみやかに中和します。
ビオチン	30mg	食物の消化を促します。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mgを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



### お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4  
<http://www.ssp.co.jp/>



Boehringer 提携  
Ingelheim 日本ベリンガー・インゲルハイム株式会社