



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ザッツ錠

胃腸薬

第2類医薬品

特徴

- 胃が張った感じがする、胃がもたれるといった症状に適した胃腸薬です。
- 胃腸機能を調整するカルニチン塩化物が弱った胃のはたらきを高め、胃部膨満感、胃もたれ等にすぐれた効果をしめします。また5種の健胃生薬がこのはたらきを助けます。
- 3種の制酸成分の組み合わせにより、おだやかな制酸作用をしめし、胃重、胃部不快感、胸やけ等を緩和します。
- 生薬のカンゾウが飲みすぎ、食べすぎ等により荒れた胃の粘膜の修復を助けます。
- スツとした清涼感と芳香があり、暗かっ色の微細な斑点がある淡黄かっ色～淡かっ色の服用しやすい錠剤です。



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
□の渇き、便秘、下痢
4. 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能

- 胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胃重、胃部不快感、食欲不振、胃弱
- 飲みすぎ、食べすぎ、消化不良、胸つかえ
- 胸やけ、げっぷ、胃痛、胃酸過多、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

(裏面へ続く)

用法・用量

次の量を、食前または食後に、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
8歳～14歳	2錠	
5歳～7歳	1錠	
5歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

成分 9錠(15歳以上の1日服用量)中

はたらき	成分	含量
胃腸機能の調整	カルニチン塩化物	450mg
	陳皮乾燥エキス	150mg(チンピ1,200mgより抽出)
健胃生薬	コウボク乾燥エキス	20mg(コウボク240mgより抽出)
	ソウジュツエキス(乾燥)	60mg(ソウジュツ300mgより抽出)
	ショウキョウエキス(乾燥)	10mg(ショウキョウ100mgより抽出)
	チョウジ末	30mg
胃粘膜の修復	カンゾウエキス末	125mg(カンゾウ500mgより抽出)
	合成ヒドロタルサイト	700mg
制酸	水酸化マグネシウム	450mg
	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	300mg

添加物：合成ケイ酸Al、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、l-メントール、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元  武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号