

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃の痛み・胸やけ・飲み過ぎに

新キーパーU[®]細粒

医薬品

ウルソデオキシコール酸と2種類の制酸剤を配合の複合胃腸薬

特 徴

新キーパーU細粒は、胃酸が過剰に分泌されておこる胸やけ、げっぷなどの胃の不快感な症状を改善します。さらに、鎮痛・消化・健胃・粘膜修復の作用もあわせ持つすぐれた効きめの緑の細粒です。

新キーパーU細粒は、即効性の炭酸水素ナトリウムと持続性の合成ヒドロタルサイトの組み合わせによって過剰な酸を中和して胃酸過多を改善し、ロートエキスが胃酸分泌を抑制して胃の痛みなどの不快な症状を取り除き、さらに3種の健胃生薬が弱った胃のはたらきを助けます。

新キーパーU細粒は、現代人の食生活やストレスの多いライフスタイルにマッチした現代人のための胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、胃弱
- 胃重、もたれ、消化不良、胃部・腹部膨満感、食べ過ぎ
- 飲み過ぎ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、胃部不快感、食欲不振、嘔吐

胃の痛みにも…



胸やけにも…



飲みすぎにも…



用法・用量

次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	8才以上 ～11才未満	5才以上 ～8才未満	3才以上 ～5才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3才未満には服用させないでください。

成分と作用

大人1日量3包(4.2g)中に次の成分を含んでいます。

分類	成分	作用
制酸剤	合成ヒドロタルサイト 1,200mg	過剰な胃酸を速効的かつ持続的に中和し、胃の酸度を適切に保つことにより、げっぷ・胸やけなど胃酸過多による不快な症状を抑えます。
	炭酸水素ナトリウム 600mg	過剰な胃酸を速効的に中和する成分です。
	ロートエキス 30mg	胃腸の働きをコントロールする神経に作用して、胃酸の分泌を抑え、胃の痛みをしずめます。
利胆剤	ウルソデオキシコール酸 15mg	胃液、胆汁の分泌促進作用と、もたれの原因になりやすい脂肪の消化吸収を促進する作用があります。
粘膜修復剤	銅クロロフィリンナトリウム 45mg アカメガシワ(赤芽柏)末 400mg	銅クロロフィリンナトリウム(クロロフィルを安定化したもの)、赤芽柏末は、胃の粘膜組織を修復、保護します。
健胃生薬	ハッカ油 30mg ウイキョウ油 12mg チョウジ油 12mg	芳香性・苦味性健胃生薬が口の粘膜や胃壁を刺激して、消化液の分泌を促し、食欲の増進をはかり、弱った胃の働きを回復します。
消泡剤	ジメチルポリシロキサン 60mg	微量で消泡作用を示し、胃に滞留した気泡やガスを取り除いて、不快なげっぷや胃の膨満感を除去します。

○添加物として乳糖、パレイシヨデンブ、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ℓ-メントール、エタノール、香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 1包を分割し服用した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (5) 外箱に表示の期限内にご使用ください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。
株式会社カイゲン お客様相談室 電話 06-6202-8911
受付時間：9:00～17:00(土曜、日曜、祝日を除く)