

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)  
電話 (048) 648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **株式会社 富士薬品**  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

14EL00

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

総合胃腸薬

食べすぎ・飲みすぎ・胸やけに

## 富士<sup>®</sup>胃腸薬〈細粒〉

◆富士胃腸薬は、食べすぎ・飲みすぎ・胸やけ・胃もたれなどの諸症状に、制酸剤、消化酵素、健胃生薬に加え粘膜修復剤を配合し、優れた効果を発揮します。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は服用しないでください。  
透析療法を受けている人
  2. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3)次の診断を受けた人  
腎臓病

裏面もお読みください。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効 能 ・ 効 果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、消化不良、胃弱、消化促進

### 用 法 ・ 用 量

次の1回量を1日3回、食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上（成人）	1 包	3 回
11才以上15才未満	2/3 包	
8 才以上11才未満	1/2 包	
5 才以上 8 才未満	1/3 包	
5 才未満	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量をお守りください。  
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成 分 ・ 分 量

1日量3包（1包1,300mg）

成 分	含 量	はたらき
ケイ酸アルミン酸マグネシウム（ノイシリンA）	1,200mg	持続的に胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。
炭酸マグネシウム	300mg	即効的に胃酸を中和し、胃酸過多、胸やけを改善します。
炭酸水素ナトリウム	750mg	
アルジオキサ	60mg	荒れた胃粘膜を修復、保護します。
銅クロロフィリンナトリウム	48mg	荒れた胃粘膜を保護、修復します。
カンゾウ末	300mg	胃粘膜の炎症を抑え、保護、修復します。
ビオチン	35mg	炭水化物を消化する酵素です。
プロザイム	30mg	タンパク質を消化する酵素です。
ケイヒ末	300mg	食欲を増進する芳香健胃生薬です。
ゲンチアナ末	150mg	胃のむかつき、食欲不振を改善する苦味健胃生薬です。

添加剤：乳糖水和物、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、L-メントール、香料 含有

### <成分・分量に関連する注意>

服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンナトリウム（緑色）が排泄されるためなので心配いりません。