

胃痛・胸やけに

胃腸鎮痛鎮痙薬

コランチル[®]A 顆粒

シオノギ製薬

コランチルA 顆粒は、淡い甘味のある白色の顆粒剤で、すぐれた効き目の鎮痛鎮痙剤、制酸剤を含んでいます。



使用上の注意 ……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい
(目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります)
4. 長期連用しないで下さい

相談すること



1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
口のかわき、便秘、下痢

…… 効能・効果 ……

- 胃痛，腹痛，さしこみ(疝痛・癢)
- 胃酸過多，胸やけ

…… 用法・用量 ……

次の量を食間におのみ下さい。(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。

…… 成分・分量 ……

コランチルA顆粒は，白色の顆粒剤で，1包(1g)中に次の成分を含有しています。

成 分		含 量 (1包中)	は た ら き
鎮痛鎮痙剤	ジサイクロミン塩酸塩	5 mg	胃の神経と筋肉の両面に働いて，痙れんをしずめ痛みを止める
制酸剤	乾燥水酸化アルミニウムゲル	400 mg	速効性(酸化マグネシウム)と持続性(水酸化アルミニウムゲル)の制酸剤を配合し，適切な胃内酸度を持続するので，胃酸過多による胸やけ，空腹時の痛みなどを改善する
	酸化マグネシウム	200 mg	

添加物として ヒドロキシプロピルセルロース，白糖，トウモロコシデンプン，ステアリン酸，含水二酸化ケイ素を含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない，涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり，品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は，服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店，または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948，東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時(土，日，祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

…… 包 装 ……

コランチルA顆粒：40包(1g×40)

Ⓜ：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社
大阪市中央区道修町3丁目1番8号