



下線部：2002年10月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



## 鎮痛鎮痙胃腸薬

# 新イソU

胃痛、胃酸過多、腹痛に

- 胃酸の分泌を抑える生薬のエンゴサク末と副交感神経遮断剤の塩酸オキシフェンサイクリミン配合で、夜中や明け方の胃痛にも効果をあらわします。
- 痛みを鎮める局所麻酔剤のアミノ安息香酸エチルを配合しています。
- 3種の制酸剤の組み合わせで、過剰の胃酸を中和すると共に、胃粘膜を保護します。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 8歳未満の小児。
  - (2) 透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

口のかわき、便秘、下痢

【効能】

胃痛、胃酸過多、胸やけ、腹痛、さしこみ(疝痛、癢)

【用法・用量】

下記の1回服用量を食後に服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
8~14才	2錠	
8才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量と働き】 12錠中

成分	分量	働き
【外層】		
水酸化アルミナ マグネシウム	1,350mg	過剰な胃酸を持続的に中和すると共に、胃壁を保護します。
炭酸水素ナトリウム	900mg	過剰な胃酸を速やかに中和します。
炭酸マグネシウム	360mg	
【内層】		
塩酸オキシフェン サイクリミン	7mg	副交感神経に作用して、胃酸の分泌を抑えます。
アミノ安息香酸エチル	160mg	局所麻酔作用により、胃の痛みを抑えます。
エンゴサク末	450mg	鎮痛・鎮痙・胃酸分泌抑制作用があり、胃の痛み、胸やけなどに効果があります。

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルスターチを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 医薬情報部「お客様相談課」

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

MANUFACTURED BY  
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. TAIWAN  
IMPORTED & DISTRIBUTED BY  
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. JAPAN  
MADE IN TAIWAN