

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

下痢・食あたりに

エクトール赤玉[®]

第2類医薬品

下痢止め薬

エクトール赤玉の特徴

下痢は腸の細菌感染、食べすぎ・飲みすぎ・寝冷えなどによる消化不良、ストレスによる神経性のものなど、いろいろな原因により起こります。

エクトール赤玉は、5つの成分の作用により、いろいろな原因で起こる下痢を治します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (5) 高齢者
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の症状のある人
排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
□のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	6錠	3回を限度とし服用して下さい。 服用間隔は4時間以上おいて下さい。
11歳以上15歳未満	4錠	
8歳以上11歳未満	3錠	
5歳以上8歳未満	2錠	
3歳以上5歳未満	1錠	
3歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。
- (4) 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

〈錠剤の取り出し図〉



成分・分量

本剤は、18錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
アクリノール水和物	120mg	腸内病原菌に対する殺菌作用により、下痢を止めます。
タンニン酸ベルベリン	180mg	腸内病原菌に対する殺菌作用と収れん作用により、下痢を止めます。
ウルソデオキシコール酸	30mg	利胆作用により、消化を助けます。
ゲンノショウコエキス末 (原生薬として1500mg)	250mg	収れん作用により、下痢を止めます。
ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして45mg)	135mg	鎮痛、鎮痙作用により、痛みをやわらげます。

添加物：パレイショデンプン、乳糖、セルロース、無水ケイ酸、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、赤色102号

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

B1 登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10