

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



下痢・食あたり
セイロガン糖衣A 胃腸薬[®]

セイロガン糖衣A

下痢は、消化不良、食あたり、水あたりといった様々な原因により、腸のぜん動運動が過剰に亢進したときや、腸管内の水分の吸収・分泌のバランスがくずれて腸管内の水分量が多くなったときに起こります。

セイロガン糖衣Aは、日常おこりがちな消化器官系疾患としての下痢、食あたり、水あたりなどに有効に作用します。本剤は主成分の日局クレオソート(木クレオソート)をはじめ、ゲンノショウコ末、オウバク乾燥エキスを合理的に配合した、においを抑えた白い錠剤です。

【使用上の注意】

してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の方は服用しないでください。

- (1)今までに本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、むくみなど)を起こしたことがある方
- (2)5才未満の乳幼児(のどにつかえる恐れがあります)
- (3)透析療法を受けている方

2. 本剤を服用している間は、他の止瀉薬(下痢止め薬)を服用しないでください。

3. 長期連用しないでください。

4. 本剤を「効能」以外の目的には使用しないでください。

相談すること



1. 次の方は本剤を服用する前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けておられる方
- (2)急性の激しい下痢、発熱を伴う下痢、血便、粘液便又は腹痛・腹部膨満・はきけなどの症状を伴う下痢のある方
- (3)妊娠、妊娠していると思われる方又は授乳中の方
- (4)高齢者
- (5)本人又は父母、兄弟姉妹がアレルギー体質の方
- (6)薬や化粧品などによるアレルギー症状を起こしたことがある方
- (7)肝臓や腎臓に疾患のある方

2. 次の場合には、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、むくみ
消 化 器	恶心・嘔吐、便秘、食欲不振、胃部不快感
精神神経系	めまい、頭痛

- (2)数日間(目安として4~5日間)服用しても、症状の改善がみられない場合

【効 能】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

(裏面もお読みください)

【用法・用量】

次の量を食後(なるべく30分以内)に必ず水またはお湯といっしょに服用してください。

年令	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
11才以上15才未満	3錠	
5才以上11才未満	2錠	
5才未満	服用しないでください	

【用法・用量についての注意】

- (1) 定められた用法・用量を必ず守ってください。
- (2) 5才以上の小児に服用させる場合には、服用量のまちがいや薬剤がのどにつかえることがないよう、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

12錠(成人の1日最大服用量)中、次の成分を含みます。

成 分	分 量	はたらき
日局 クレオソート*	270mg	腸内静菌、腸の過剰なぜん動運動を抑える、腸管内の水分量を調整する
日局 ゲンノショウコ末	300mg	腸の調子を整える
オウバク乾燥エキス	300mg	腸内静菌、健胃作用、炎症を抑える

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、ケイ酸A1、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有しています。この他に糖衣層として、白糖、アラビアゴム、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、CMC-Na、マクロゴール、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

*一般に「クレオソート」と呼ばれるものには、日局クレオソート(木クレオソート)(CAS Reg. No.8021-39-4)以外に、石炭より抽出される工業用のクレオソート油(石炭クレオソート)(CAS Reg. No.8001-58-9)があります。両者はその原料、成分及び用途が異なる全く別の物質です。(CAS Reg. No.とは化学物質固有の登録番号です。)

当社製品にかかわる文献や、詳しい内容については、
ホームページ(<http://www.seirogan.co.jp>)をご覧になるか、
お客様相談係にお問合せください。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手のとどかない所に保管してください。
2. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器には絶対に入れかえないでください。
3. 本剤に他の薬剤などを絶対に混ぜないでください。
4. 本剤は、白色でツヤのある錠剤です。開封後は、キャップをしっかりと締めて、直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管してください。
また、まれにツヤがなくなったり、すこし変色することがあります、服用にはなんら問題はありません。
5. ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので取り除いてください。
6. 使用期限の過ぎたものは、服用しないでください。

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

大幸薬品株式会社 お客様相談係：電話(06)6382-1095
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝日を除く)

製造発売元



大幸薬品株式会社

〒564-0032 大阪府吹田市内本町3丁目34番14号

01005015