

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 高級整腹

第2類医薬品



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
3. 服用時には飲酒しないでください。
4. 1週間以上継続して服用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はき気等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
  - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (5) 小児。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (8) 薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人。
  - (9) 次の症状のある人。排尿困難
  - (10) 次の診断を受けた人。心臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

  - (2) 5～6日服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

■ 効能・効果:

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

■ 用法・用量:

1 5歳以上 1回30粒  
1 1歳以上 1 5歳未満 1回20粒  
8歳以上 1 1歳未満 1回15粒  
5歳以上 8歳未満 1回10粒  
3歳以上 5歳未満 1回7粒  
1日2回を限度とし、服用ください。服用間隔は4時間以上おくこと。

■ 成分・分量 (60粒(1日)中):

次硝酸ピスマス・・・600mg リュウタン末・・・200mg  
センブリ末・・・200mg ロートエキス・・・40mg  
ゴバイシ末・・・600mg オウバクエキス(原生薬換算量 1.4g)・400mg  
添加物; サリチル酸、デヒドロ酢酸 Na、カルメロース Ca、米の粉、タルク、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン

【用法用量に関する注意】

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 くすり相談窓口: ☎ 076-421-3530  
月曜～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

製造販売元 株式会社島伊兵衛薬品 富山県富山市梅沢町1丁目7-13