

生 薬
日本薬局方
ジュウヤク
(十 薬)

第3類医薬品

△〔使用上の注意〕

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3. 本剤の服用により、まれに吹出物の症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

便秘、便秘に伴う吹出物

〔用法・用量〕

大人(15歳以上)は、1日量15gを水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前又は食前3回に分服してください。
15歳未満7歳以上大人の2/3量、7歳未満4歳以上大人の1/2量、4歳未満2歳以上大人の1/3量、2歳未満大人の1/4量以下

○用法・用量に関連する注意

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないでください。なお、生後3ヵ月以上であっても1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)

〔副作用被害救済制度〕 ☎0120-149-931

500g



4 987457 656010

B2

製造販売元



松浦薬業株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21

お客様相談窓口 TEL 052-883-5172

受付時間 10:00~17:00

(土・日・祝日を除く)