

生薬
日本薬局方
セナ

刻

第②類医薬品

△【使用上の注意】

⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下薬（下剤）
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 3.大量に服用しないでください。

△【相談すること】

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4)次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 4.1週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和；頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【用法・用量】

大人（15才以上）は、1日1回1.5～3gに熱湯約150mlを加え15分間煮た後、滓をこして取り去り、就寝前に服用してください。ただし、小児は次の分量を1日1回就寝前に服用してください。

15才未満 11才以上	大人の2/3
11才未満 7才以上	大人の1/2
7才未満 3才以上	大人の1/3

なお、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

○【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3才未満の乳幼児には、服用させないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるため。）

【副作用被害救済制度】 ☎0120-149-931

500g



4 987457 151386

B1

製造販売元

松浦薬業株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21

お客様相談窓口 TEL 052-883-5172

受付時間 10:00～17:00

(土・日・祝日を除く)