

第②類医薬品

日本薬局方

センナ

【使用上の注意】**してはいけないこと**

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下 痢

4. 1週間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、
吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、
腸内異常発酵、痔**【用法・用量】**

| 年 齢 | 1日量 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大 人 (15歳以上) | 本品 1.5～3gを、熱湯150mLを加え、15分間煮た後、滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回服用する。ただし、初めは最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、少しずつ増量又は減量する。 |
| 15歳未満 | 服用しないで下さい |

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を厳守して下さい

【成分・分量】

1日量(3g)中

日本薬局方 センナ 3g

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる)

※**浸潤剤は腐敗を防ぐため冷所に保存して下さい。**※本品には防虫・防カビのために**脱酸素剤**を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり食べたりしないようご注意ください。**副作用被害救済制度 電話0120-149-931****お客さま相談窓口**

本製品内容についてのお問合わせは、下記にお願い申し上げます。
電話：(076)431-7017 FAX：(076)431-7013
受付時間：午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 (株)延寿堂

〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3

第②類医薬品

日本薬局方

センナ