

## 日本薬局方 センナ末

### 第②類医薬品

#### ⚠️ (使用上の注意)

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(成 分)  
日本薬局方 センナ末

#### (効能・効果)

##### 便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

#### (用法・用量)

大人(15歳以上)は1日1回0.375~0.75gをなるべく就寝前に服用してください。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。(添付のサジにすりきり一杯 0.375g)

#### ○用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 15歳未満の小児には服用させないでください。

#### (保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4) 本剤は、天然物ですので、製品により若干色調の異なることがあります。効果には変わりありません。


#### (お問い合わせ先)

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口  
TEL (052) 883-5172  
受付時間10:00~17:00(土・日・祝日を除く)  
[副作用被害救済制度] ☎0120-149-931



製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21

 PE, 金属, PET