

第②類医薬品

# 日本薬局方



# 七厘散

500g

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町2丁目1-17  
工場 東大阪市東石切町2丁目6-52

## ⚠ 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、他の瀉下剤(下剤)を服用しないでください。
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

激しい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	激しい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1週間位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ▲ 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- (5) 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください。
- (6) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
- (7) 服用に際しては、説明文をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。



第②類医薬品

日本薬局方

センナ

## ■用法及び用量

大人(15才以上)は1日量1.5~3gを熱湯150mlを加え15分間煮た後、滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら、少しずつ増量又は減量する。

## ■効能又は効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重・のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔。

## 〈用法・用量に関する注意〉

◎服用に際して、定められた用法・用量を厳守してください。