

改訂年月 平成25年2月

(相談すること) の3. の下線部追記及び消費者相談窓口の変更)

服用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

第2類医薬品

便秘治療薬

新アスペン[®]タイワ

ウルソデオキシコール酸と7種類の生薬配合



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

【効能又は効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

【用法及び用量】

年齢区分	1回量	服用回数	服用時期
15歳以上	3～6錠	1日2回	朝夕の空腹時
11歳以上15歳未満	2～4錠		
7歳以上11歳未満	1～3錠		
7歳未満	服用しないこと		

ただし初回は最小量を用い便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

◎用法及び用量に関連する注意

- (1) 定められた用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分及び分量】

1日量（12錠）中

ウルソデオキシコール酸 ……12mg ケンゴシ末 ……200mg
アロエ末 ……200mg ダイオウ末 ……1,000mg
センナ末 ……600mg カンゾウ末 ……260mg
オウレン末 ……100mg オウゴン末 ……120mg
添加物としてアルギン酸ナトリウム、乳糖水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロースを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 本剤は生薬を多く含む製剤ですから、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。

消費者相談窓口

大和製薬株式会社

所在地 富山県富山市水橋二杉1-2

TEL 076 (478) 5171

受付日時 月～金曜日 AM10:00～PM3:00

（祝・祭日を除く）

製造販売元



大和製薬株式会社

富山県富山市水橋二杉1-2